




# LE CANCER DU SEIN

## L'ESSENTIEL DES CHIFFRES

# Cancer du sein

## Cancer le plus fréquent chez la femme en France<sup>1-5</sup>

Le cancer du sein se situe au  
**1<sup>ER</sup> RANG**  
des cancers chez la femme



# Cancer du sein

## 1<sup>ère</sup> cause de mortalité par cancer chez la femme<sup>1,2,4,5</sup>

3<sup>ème</sup> CAUSE

de mortalité par cancer



\* Estimation 2018

TAUX DE MORTALITÉ\*


14,0

100 000  
FEMMES

INCIDENCE MONDE



626 000 EN 2018



Une mortalité stable jusqu'à 1995, puis a diminué significativement



1990 - 2018  
- **1,3 %**  
par an  
en moyenne

TAUX D'INCIDENCE STANDARDISÉ  
POUR 100 000 PERSONNES - ANNÉES

# Cancer du sein

## Une survie qui s'améliore au cours du temps<sup>1,2,4</sup>

### Survie à 5 ANS




### Survie à 10 ANS





\*Sur la période 1989 - 2010

### VARIATION DE LA SURVIE À 5 ANS AU COURS DU TEMPS



Amélioration liée à une **plus grande précocité** du **DÉPISTAGE** et **DIAGNOSTIC** et aux **PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES** de ces dernières années

### VARIATION DE LA SURVIE À 5 ANS SELON L'ÂGE



**Survie à 5 ANS**  
la **plus élevée** en Europe

# Cancer du sein

## Les facteurs du risque<sup>5</sup>

### FACTEURS DE RISQUE DÉMONTRÉS




#### SEXE

<1% chez l'homme



#### AGE

> 50 ans



#### PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE

altération génétique des gènes BCRCA1 ou BCRCA2



#### ANTECEDENT PERSONNEL DE CANCER DE SEIN

invasif ou de carcinome canalaire *in situ*, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de cancer lobulaire *in situ*



#### ANTECEDENT PERSONNEL D'IRRADIATION THORACIQUE MÉDICALE

à haute dose (dont antécédent d'irradiation pour maladie de Hodgkin)

### FACTEURS DE RISQUE DISCUTÉS



Densité mammaire radiologique après la ménopause > 75%



Traitement hormonal de la ménopause



Âge précoce de la puberté



Nulliparité



Âge tardif à la 1<sup>ère</sup> grossesse



Mode de vie sédentaire, obésité après la ménopause

# Cancer du sein

## Le risque relatif en fonction du facteur de risque<sup>5</sup>

| Risque relatif peu élevé (<2)                           | Risque relatif élevé (entre 2 et 4)   | Risque relatif très élevé (>4)  |
|---|---|---|
| Traitement hormonal de la ménopause                     | Antécédent familial de cancer du sein invasif chez un parent au 1 <sup>er</sup> degré | Antécédent familial de cancer du sein invasif chez 2 parents au 1 <sup>er</sup> degré |
| Nulliparité   | Irradiation du thorax pour traiter un cancer (Maladie de Hodgkin)                     | Âge > 50 ans  |
| Âge de la ménopause > 55 ans vs < 55 ans                | Densité mammaire après la ménopause   | Antécédent personnel de cancer du sein invasif  |
| Âge des 1 <sup>res</sup> règles < 12 ans vs > 14 ans    | Hyperplasies atypiques  | Carcinome canalaire <i>in situ</i>  |
| Âge à la 1 <sup>re</sup> grossesse > 30 ans vs < 30 ans |   | Carcinome lobulaire <i>in situ</i>  |
| Obésité après la ménopause                              |   |   |
| Alcool  |   |   |
| Sédentarité   |   |   |

# Références

---

1. Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018 - Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim. Synthèse. Collection Les Données/Épidémiologie, Institut National du Cancer, juillet 2019. Pages 3-5,11.
2. Les cancers en France. Édition 2017, Collection Les Données/Épidémiologie, Institut National du Cancer, juillet 2018. Pages 64,64,68.
3. Les cancers en France - L'essentiel des faits et chiffres. Édition 2019, Collection Les Données/Épidémiologie, Institut National du Cancer, février 2019. Pages 9,23.
4. InVS. <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/donnees/#tabs> (site consulté le 2 août 2019)
5. HAS. Actualisation du référentiel de pratiques de l'examen périodique de santé. Dépistage et prévention du cancer du sein. Février 2015. Pages 4-6,9,70.

*Doing now what patients need next*